

... Quand est-il important pour un malade de Waldenström d'appeler très rapidement son hématologue ?

Appeler très rapidement son hématologue dans les cas suivants :

- **D'une manière générale :**

Ganglions douloureux ou enflés, infection, toux forte, manque de souffle, fatigue excessive et brutale, perte de poids, forte transpiration, démangeaisons ou éruption cutanée fortes.

- **Pour un patient en aplasie** (peu de globules blancs - neutrophiles $< 500/\text{mm}^3$) :

Fièvre

Signes de gravité : frissons incontrôlables des quatre membres, diarrhée profuse, difficulté à respirer.

Si l'hématologue a établi une ordonnance avec deux antibiotiques à ne prendre qu'en cas de fièvre $> 38^\circ$: débuter immédiatement l'antibiothérapie et voir son hématologue 24H après.

- **Pour un patient en thrombopénie** (peu de plaquettes) :

Saignements de nez, saignements de bouche, saignement des gencives, purpura (taches pourpres) sur membre inférieur.

- **Pour un patient en anémie** (peu de globules rouges) :

Pâleur de la peau et des muqueuses (intérieur de la paupière inférieure, pulpe des doigts, gencives), selles foncées, vertiges, bourdonnements d'oreilles, vomissement de sang.